

МІСЦЕ МАМОГРАФІЇ ПРИ РАННІЙ ДІАГНОСТИЦІ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

Калашник А. О.

Науковий керівник – д-р мед. наук, проф. Дужий І. Д.

Сумський державний університет,

кафедра загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії

Діагностика раку молочної залози залишається вельми важливою проблемою, оскільки протягом останніх років вона не має тенденції до зменшення. Так, захворюваність серед міського населення зустрічається частіше, ніж у сільського. Частіше хворіють жінки у віці 40–59 років.

Щорічно рак молочної залози забирає життя майже 7,5 тис. жінок по всій Україні. Враховуючи це, метою нашої роботи є оцінка діагностичної ефективності мамографії при ранній діагностиці раку молочної залози.

З огляду на це рання діагностика захворювань молочної залози є однією із актуальних задач сучасної медицини. В Україні, як і в більшості країн Європи, рак молочної залози займає перше місце у структурі онкологічних захворювань серед жінок, і становить 22-25%. Разом з тим результати лікування хворих на рак молочної залози залишаються невтішними, оскільки у значної частини хворих, незважаючи на проведенне комбіноване і комплексне лікування, виникають віддалені метастази і призводять до загибелі пацієнтів. З огляду на це у даний час найбільш важливим є раннє виявлення раку та передракових станів, що дозволяє підвищити результативність лікування, що і визначає актуальність проблеми.

Задачі:

- Оцінити діагностичну ефективність мамографії при ранній діагностиці раку молочної залози.
- Порівняти діагностичну ефективність мамографії при ранній діагностиці раку молочної залози з УЗД.
- Розробити практичні рекомендації щодо покращення діагностування раку молочної залози на ранній стадії.

Матеріали і методи. На базі Сумського обласного психоневрологічного диспансеру було проведено 1500 мамографічних досліджень, при яких у 47 обстежених виявлений рак молочної залози. Середній вік цих жінок склав $48,8 \pm 10,4$ років (від 40 до 76 років). Кількість осіб міського населення із встановленим раком залози склали 68%, а сільського – 32 %. Мастопатія виявлена у 450 (30 %) досліджених. Цим хворим було проведено УЗД молочної залози. З них у 13 був виявлений рак молочної залози на ранній стадії, який у подальшому за допомогою рентгенівської мамографії був підтверджений.

Висновок. Виявлення раку молочної залози на ранніх стадіях при мамографічному обстеженні свідчить про високу діагностичну ефективність цього методу, що дає право рекомендувати його проведення 1 раз на 2 роки.

Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 16-18 квітня 2014 р. / М.В. Погорелов. - Суми : СумДУ, 2014. - С. 253.